



Protocolo: **2 44721**
Paciente: **CENTINEO(PUPINA), CANINO**
MESTIZO
Médico: **TROSCE, PABLO WUAU**

Fecha: **29/08/2026**
auto: **35858**

HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

SERIE BLANCA

Glóbulos Blancos: 9.800 /mm3 V.N.: 6.000 -17.000 mm3

FÓRMULA LEUCOCITARIA

Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 6,00 %

Neutrófilos Segmentados: 64,00 %

Eosinófilos: 2,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 24 %

Monocitos: 4,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 588 /mm3 V.N.: 0-300 mm3

Neutrof. Segmentados Abs 6.272 /mm3 V.N.: 3.000 -11.500 mm3

Eosinófilos Abs 196 /mm3 V.N.: 100 -1.250 mm3

Basófilos Abs 0 /mm3 V.N.: 0 - 50 mm3

Linfocitos Abs 2.352 /mm3 V.N.: 1.000 - 4.800 mm3

Monocitos Abs 392 /mm3 V.N.: 150 -1.350 mm3

Comentarios serie blanca Liger desvío a la izquierda regenerativo. Sugerente de proceso inflamatorio agudo. Valorar los resultados en base a la historia clínica del animal.

SERIE ROJA

Glóbulos Rojos: 4,18 millo./mm3 V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm3

Hematocrito: 30,10 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 10,00 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCM: 72,00 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 23,90 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 33,20 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Anemia ligera, normocítica, normocrómica con ligera anisocitosis y anisocromia. Se observa marcada cantidad de anulocitos y escasos dianocitos. Anulocitos: Este cambio se produce por descenso del contenido de Hb (ej: deficiencia de Fe).

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462


HEMOGRAMA Canino (p)
Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

Dianocitos: Este cambio se produce por alteración de la membrana plasmática por causas fisiológicas y patológicas, deficiencia de Fe, anemia regenerativa, hipercolesterolemia entre otras.

SERIE PLAQUETARIA
Plaquetas:
159.000
/mm³

 V.N.: 160.000 - 500.000 / mm³
Comentarios plaquetas:

En el frotis se observan pequeños y aislados agregados plaquetares. El recuento de plaquetas puede estar subestimado. Valorar clínicamente.

Urea Can (p)
Método: Colorimétrico
Material: Suero
Resultado
20
mg/dL

V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL

Creatinina S. Can (p)
Método: Colorimétrico
Material: Suero
Resultado
0,60
mg/dL

V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL

ast-GOT (p)
Método: UV -VIS
Material: Suero
Resultado
271
UI/l

V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

alt-GPT (p)
Método: UV -VIS
Material: Suero
Resultado
162
UI/l

V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

Fosfatasa alcalina Can (p)
Método: Colorimétrico
Material: Suero
Resultado
756
UI/l

V.N.: Canino : hasta 300 UI/L

La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.

Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)
Método: Colorimétrico
Material: Suero
Proteínas totales (Can)
5,77
g/dl

V.N.: 5,5 - 7,5 g/dl

Albúmina (Can)
2,72
g/dl

V.N.: 2,5 - 4 g/dl

Globulina (Can)
3,05
g/dl

V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl

Relación A/G (Can)
0,89

V.N.: 0,6 - 1,1

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
 MP 1462



Perfil básico

Material: Suero, Sangre Entera con EDTA

Compuesto por 9 parámetros.

Comentarios

Comentarios: Sin Comentarios

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462