



Protocolo: **2 44570**
Paciente: **CENTINEO(AMALIA), CANINO**
Médico: **TROSCE, PABLO WUAU**

Fecha: **26/08/2026**
auto: **35742**

HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

SERIE BLANCA

Glóbulos Blancos: 12.200 /mm³ V.N.: 6.000 -17.000 mm³

FÓRMULA LEUCOCITARIA

Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 3,00 %

Neutrófilos Segmentados: 63,00 %

Eosinófilos: 2,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 28 %

Monocitos: 4,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 366 /mm³ V.N.: 0-300 mm³

Neutrof. Segmentados Abs 7.686 /mm³ V.N.: 3.000 -11.500 mm³

Eosinófilos Abs 244 /mm³ V.N.: 100 -1.250 mm³

Basófilos Abs 0 /mm³ V.N.: 0 - 50 mm³

Linfocitos Abs 3.416 /mm³ V.N.: 1.000 - 4.800 mm³

Monocitos Abs 488 /mm³ V.N.: 150 -1.350 mm³

Comentarios serie blanca Ligero desvío a la izquierda regenerativo. Sugerente de proceso inflamatorio agudo. Valorar los resultados en base a la historia clínica del animal.

SERIE ROJA

Glóbulos Rojos: 6,64 millo./mm³ V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm³

Hematocrito: 48,00 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 16,00 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCM: 72,30 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 24,00 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 33,30 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Sin particularidades

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas: 399.000 /mm³ V.N.: 160.000 - 500.000 / mm³

Comentarios plaquetas: En el frotis se observan pequeños y aislados agregados plaquetares. El recuento de plaquetas puede estar subestimado. Valorar clínicamente.

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Urea Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	30	mg/dL	V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL
Creatinina S. Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	0,74	mg/dL	V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL
ast-GOT (p)			Método: UV -VIS Material: Suero
Resultado	34	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
alt-GPT (p)			Método: UV -VIS Material: Suero
Resultado	58	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
Fosfatasa alcalina Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	688	UI/l	V.N.: Canino : hasta 300 UI/L La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.
Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Proteinas totales (Can)	6,71	g/dl	V.N.: 5,5 -7,5 g/dl
Albúmina (Can)	3,18	g/dl	V.N.: 2,5 - 4 g/dl
Globulina (Can)	3,53	g/dl	V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl
Relación A/G (Can)	0,90		V.N.: 0,6 - 1,1
Perfil básico			Material: Suero, Sangre Entera con EDTA
Compuesto por	9 parámetros.		
Comentarios			
Comentarios:	Sin Comentarios		

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462