


 Protocolo: **2 44568**
 Paciente: **DEJANDO.HUELLAS(REINIS), CANINO**
MESTIZO
 Médico: **TROSCE, PABLO WUAU**

 Fecha: **26/08/2026**
 auto: **35741**
HEMOGRAMA Canino (p)
Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA
SERIE BLANCA
Glóbulos Blancos: 11.200 /mm3 V.N.: 6.000 -17.000 mm3

FÓRMULA LEUCOCITARIA
Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 3,00 %

Neutrófilos Segmentados: 71,00 %

Eosinófilos: 5,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 18 %

Monocitos: 3,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 336 /mm3 V.N.: 0-300 mm3

Neutrof. Segmentados Abs 7.952 /mm3 V.N.: 3.000 -11.500 mm3

Eosinófilos Abs 560 /mm3 V.N.: 100 -1.250 mm3

Basófilos Abs 0 /mm3 V.N.: 0 - 50 mm3

Linfocitos Abs 2.016 /mm3 V.N.: 1.000 - 4.800 mm3

Monocitos Abs 336 /mm3 V.N.: 150 -1.350 mm3

Comentarios serie blanca Liger desvío a la izquierda regenerativo. Sugerente de proceso inflamatorio agudo. Valorar los resultados en base a la historia clínica del animal.

SERIE ROJA
Glóbulos Rojos: 7,03 millo./mm3 V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm3

Hematocrito: 46,80 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 15,60 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCM: 66,60 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 22,20 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 33,30 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Sin particularidades

SERIE PLAQUETARIA
Plaquetas: 166.000 /mm3 V.N.: 160.000 - 500.000 / mm3

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



HEMOGRAMA Canino (p)			Método: Impedancia/MO
			Material: Sangre Entera con EDTA
Comentarios plaquetas:		En el frotis se observan pequeños y aislados agregados plaquetares. El recuento de plaquetas puede estar subestimado. Valorar clínicamente.	
Urea Can (p)			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Resultado	32	mg/dL	V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL
Creatinina S. Can (p)			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Resultado	0,72	mg/dL	V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL
ast-GOT (p)			Método: UV -VIS
			Material: Suero
Resultado	25	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
alt-GPT (p)			Método: UV -VIS
			Material: Suero
Resultado	23	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
Fosfatasa alcalina Can (p)			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Resultado	87	UI/l	V.N.: Canino : hasta 300 UI/L La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.
Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)			Método: Colorimétrico
			Material: Suero
Proteínas totales (Can)	6,72	g/dl	V.N.: 5,5 -7,5 g/dl
Albumina (Can)	3,10	g/dl	V.N.: 2,5 - 4 g/dl
Globulina (Can)	3,62	g/dl	V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl
Relación A/G (Can)	0,86		V.N.: 0,6 - 1,1
Perfil básico			Material: Suero, Sangre Entera con EDTA
Compuesto por	9 parámetros.		

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Comentarios

Comentarios:

Sin Comentarios

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462